

## SCHEMA DI PRETRATTAMENTO FARMACOLOGICO IN PAZIENTI CON ANAMNESI ALLERGICA

In caso di anamnesi positiva per reazioni allergiche al MDC o ad altri farmaci, alimenti o sostanze di vario genere può essere utile eseguire una terapia desensibilizzante, sebbene la sua utilità sia peraltro limitata, utilizzando gli schemi farmacologici sotto riportati.

### ADULTI

#### 12 ore prima dell'esame

DELTACORTENE (PREDNISONE) 25 mg	2 compresse
Protettore gastrico	1 compressa

#### 2 ore prima dell'esame

DELTACORTENE (PREDNISONE) 25 mg	1 compressa
Protettore gastrico	1 compressa

#### 1 ora prima dell'esame

CETIRIZINA	1 compressa
------------	-------------

**N:B:** Nei pazienti diabetici o con controindicazione all'uso dei cortisonici verrà somministrato solo l'antistaminico.

### BAMBINI

#### 12 ore prima dell'esame

DELTACORTENE (PREDNISONE)	0,5-0,7 mg/kg per os
---------------------------	----------------------

#### 2 ore prima dell'esame

DELTACORTENE (PREDNISONE)	0,5-0,7 mg/kg per os
---------------------------	----------------------

#### 1 ora prima dell'esame

CETIRIZINA gocce

età tra 6-12 anni con **peso uguale o inferiore** a 30 kg (5 mg = 10 gocce)

età tra 6-12 anni con **peso maggiore** di 30 kg (10 mg = 20 gocce) in unica somministrazione.

età tra 2-6 anni: 5 mg = 10 gocce in unica somministrazione.

età tra 1-2 anni: 2,5 mg = 5 gocce in unica somministrazione.

**N:B:** Nei pazienti diabetici o con controindicazione all'uso dei cortisonici verrà somministrato solo l'antistaminico.

\_\_\_\_\_

Data

\_\_\_\_\_

Timbro e Firma del medico richiedente